



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

Acr-Bis(40%,38.4%:1.6%)

简介:

丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液又称 Acr-Bis，最常用的是 30%Acr-Bis(29:1)即为含 30% Acrylamide-Bisacrylamide 的水溶液，其中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 29:1，丙烯酰胺的总比例为 30%。

Acr-Bis(40%,38.4%:1.6%)中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 38.4:1.6, 丙烯酰胺总量为 40%，常用于配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶)，如 SDS-PAGE 胶等，可以用于蛋白或核酸的分离。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

组成:

名称	编号	R21200	Storage
	Acr-Bis(40%,38.4%:1.6%)	500ml	4℃ 避光
说明书		一份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、因具体实验而异，可以参考 SDS-PAGE 凝胶配制的说明。

注意事项:

- 1、Acr-Bis(40%,38.4%:1.6%)对人体有一定神经毒性，请注意适当防护。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。