



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

TBSTx (10X) (TBS with Triton X-100, 10X)

产品编号	产品名称	包装
R32528-100ml	TBSTx (10X) (TBS with Triton X-100, 10X)	100ml
R32528-500ml	TBSTx (10X) (TBS with Triton X-100, 10X)	500ml

产品简介:

源叶生产的 TBSTx (10X), 即(TBS with Triton X-100, 10X), 可以用于免疫印迹 (Immunoblot, 即 Western blot 或 WB)、免疫荧光(Immunofluorescence, IF)、免疫组化 (Immunohistochemistry, IHC)和免疫细胞化学(Immunocytochemistry, IC)等实验中封闭液的配制、一抗或二抗的配制、一抗或二抗孵育后的洗涤等。封闭和洗涤可以降低背景, 增强信噪比。

本产品为 10X 浓缩液, 使用时须用蒸馏水或去离子水溶解配制成 1X 后使用。例如配制 1L TBSTx (1X), 取 100ml TBSTx (10X)加入 900ml 去离子水混匀即可。TBSTx (1X)溶液中含有 20 mM Tris, 137 mM NaCl, 0.1%的 Triton X-100, pH7.6±0.1 (25°C)。

对于 Western blot 实验中膜的洗涤, 按照每张膜洗涤需要 5-10 毫升 TBSTx (1X) 计算, 每 100ml TBSTx (10X)可以洗涤 100-200 次; 对于免疫染色等实验, 按照每个样品洗涤需要 0.2-1 毫升 TBSTx (1X)计算, 每 100ml TBSTx (10X)可以洗涤 1000-5000 个样品。

产品组成:

产品编号	产品名称	包装
R32528-100ml	TBSTx (10X) (TBS with Triton X-100, 10X)	100ml
R32528-500ml	TBSTx (10X) (TBS with Triton X-100, 10X)	500ml
—	说明书	1 份

保存条件:

2-8°C 保存。

注意事项:

本 TBSTx (10X)配制成 TBSTx (1X)后, 宜 4°C 保存, 并在一个月内存用。如果室温保存, 宜在一周内用完。



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明：

1. 取 100ml TBSTx (10X)，倒入到一洁净的量筒中，加入蒸馏水或去离子水混匀并定容到 1 升后即为 TBSTx (1X)。没有用完的 TBSTx (1X)可以室温保存，通常一周内是可以正常使用的，4°C 可以保存更长时间。如果发现洗涤液出现浑浊、沉淀等异常现象，须废弃。

