



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

胰酶细胞消化液(0.05%胰酶, 含酚红)

产品编号	产品名称	包装
R33088-100ml	胰酶细胞消化液(0.05%胰酶, 含酚红)	100ml

产品简介:

源叶的胰酶细胞消化液(含酚红)(Trypsin-EDTA Solution with Phenol Red)含 0.05%胰酶、0.02%EDTA 和酚红, pH 值为 7.2-7.8。该消化液经过过滤除菌, 可以直接用于培养细胞的消化, 或者一些组织的消化。

本胰酶细胞消化液(含酚红)具有方便快捷的特点, 通常室温消化 1 分钟左右就可以消化下大多数贴壁细胞。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
R33088-100ml	胰酶细胞消化液(0.05%胰酶, 含酚红)	100ml
——	说明书	一份

保存条件:

2-8℃ 保存。

注意事项:

在使用胰酶细胞消化液(含酚红)的过程中要特别注意避免消化液被细菌污染。

胰酶细胞消化液(含酚红)消化细胞时间不宜过长, 否则细胞铺板后生长状况会较差。

本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 贴壁细胞的消化:

a. 吸去培养液, 用无菌的 PBS、Hanks 液或无血清培养液洗涤细胞一次, 以去除残余的血清。

b. 加入少量胰酶细胞消化液(含酚红), 略盖过细胞即可, 室温放置 30 秒至 2 分钟。不同的细胞消化时间有所不同。

c. 显微镜下观察, 细胞明显收缩, 并且肉眼观察培养器皿底部发现细胞的形态发生明显的变化; 或者用枪吹打细胞发现细胞刚好可以被吹打下来。此时吸除胰酶细胞消化液(含酚红)。加入含血清的完全细胞培养液, 吹打下细胞, 即可直接用于后续实验。

d. 如果发现消化不足, 则加入胰酶细胞消化液(含酚红)重新消化。

如果发现细胞消化时间过长, 未及吹打细胞, 细胞已经有部分直接从培养器皿底部脱落, 直接用胰酶细胞培养液把细胞全部吹打下来。1000-2000g 离心 1 分钟, 沉淀细胞, 尽量去除胰酶细胞消化液(含酚红)后, 加入含血清的完全培养液重新悬浮细胞, 即可用于后续实验。

2. 组织的消化:

a. 不同的组织需要消化的时间相差很大, 通常以消化后可以充分打散组织为宜。