上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话：021-61312973　传真：021-55068248
网址：www.shyuanye.com
邮箱：shyysw@sina.com

Western 封闭液

简介：

Western 封闭液即 Western Blocking Buffer，可用于蛋白印迹中转移了蛋白样品的 PVDF 膜或 NC 膜的封闭，主要由 TBS、BSA、防腐剂等组成，封闭后可以减小后续的一抗或二抗和膜的非特异性结合，降低背景，增强信噪比，每张膜封闭大约需要 10～15ml 封闭液。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

组成：

编号 / 名称	R21304	Storage
Western Blocking Buffer	100ml	4℃
说明书	一份	

自备材料：

1、TBST 或 Western 洗涤液

2、摇床

操作步骤(仅供参考)：

1、蛋白印迹转膜后加入 Western 洗涤液，在摇床上摇动洗涤蛋白膜 1～2min。

2、取恰当容量的容器加入 Western Blocking Buffer，在摇床上摇动室温封闭 60min。

3、直接进行一抗孵育等后续操作。

注意事项：

1、如果对于一些背景非常高的抗体，可以 4℃封闭过夜。

2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 12 个月有效。