



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

谷丙转氨酶(GPT)活性检测试剂盒(微量法)

货号: R41799

规格: 100T/48S

产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件
提取液ES08	60mL×1瓶	2-8℃保存
R41799-A	粉剂×1瓶	2-8℃保存; 临用前加入少量提取液溶解, 并调PH值 为7.4,然后用提取液定容至2.5ml,现用现配
R41799-B	3 mL×1瓶	2-8℃保存
R41799-C	30 mL×1瓶	2-8℃保存
R41799-标准品 (20μmol/ml)	1mL×1支	2-8℃保存

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

简介

意义: 谷丙转氨酶 (Glutamic-pyruvic Transaminase, GPT) (EC 2.6.1.2) 广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中, 催化氨基酸和酮酸转氨基反应, 在氨基酸代谢中具有重要作用。此外, 哺乳动物肝细胞 GPT 活性很高, 当肝细胞坏死, GPT 释放到血液中, 血清 GPT 活性显著增高。因此, GPT 被世界卫生组织推荐为肝功能损害最敏感的检测指标。

原理: GPT 催化丙氨酸和 α -酮戊二酸发生转氨基反应, 生成丙酮酸和谷氨酸; 加入 2,4-二硝基苯肼溶液, 不仅终止上述反应, 而且与酮酸中的羰基加成, 生成丙酮酸苯腙; 苯腙在碱性条件下呈红棕色, 可以在 505nm 读取吸光值并计算酶活力。

自备用品:



可见分光光度计/酶标仪、水浴锅、台式离心机、可调式移液器、微量玻璃比色皿/96孔板、研钵/匀浆器、冰和蒸馏水。

样品制备:

1. 细菌、细胞样品的制备:

细菌或培养细胞: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 按照细菌或细胞数量 (10^4 个): 提取液 ES08 体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例 (建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液 ES08), 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 20% 或 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 8000g 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

2. 组织样品的制备:

组织: 按照组织质量 (g): 提取液 ES08 体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液 ES08), 进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

3. 血清 (浆) 样品: 直接检测。

测定步骤:

1. 分光光度计/酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 505nm, 蒸馏水调零。

2. 标准曲线的稀释: 将标准品用蒸馏水稀释至 $1\mu\text{mol/mL}$ 、 $0.8\mu\text{mol/mL}$ 、 $0.4\mu\text{mol/mL}$ 、 $0.2\mu\text{mol/mL}$ 、 $0.1\mu\text{mol/mL}$ 、 $0.05\mu\text{mol/mL}$ 、 $0\mu\text{mol/mL}$ 。

3. 在 96 孔板中按下表加入试剂:

试剂名称(ul)	测定管	对照管	标准管
待测样本	5		
R41799-A	25	25	
标准液			30
混匀后, 37℃(哺乳动物)或25℃(其它物种)预热30min			
R41799-B	25	25	25
待测样本		5	
混匀后, 37℃(哺乳动物)或25℃(其它物种)准确水浴20min			
R41799-C	240	240	240



混匀，室温放置10min,在505nm波长处，测各管吸光度。
每个测定管需设一个对照管。

计算公式:

1. 标准曲线的绘制:

以各标准溶液浓度为 x 轴，以 A₅₀₅ 为 y 轴做标准曲线，得到方程 $y=kx+b$;
将 (A 测定管-A 对照管) 带入方程求 x 值。

2. GPT活性计算:

(1) 按样本质量计算:

单位定义: 每小时每 g 样本催化产生 1 μ mol 丙酮酸的量为一个 GPT 活力单位。

$$\text{GPT (U/g 质量)} = x \times (V_{\text{样本}} + R_{41799} - A) \div (W \times V_{\text{样本}} \div V_{\text{样总}}) \div T = 12x \div W$$

(2) 按样本蛋白浓度计算:

单位定义: 每小时每 mg 组织蛋白催化产生 1 μ mol 丙酮酸的量为一个 GPT 活力单位。

$$\text{GPT (U/mg prot)} = x \times (V_{\text{样本}} + R_{41799} - A) \div (C_{\text{pr}} \times V_{\text{样本}}) \div T = 12x \div C_{\text{pr}}$$

(3) 按血清(浆)体积计算:

单位定义: 每小时每 mL 血清(浆)样本催化产生 1 μ mol 丙酮酸的量为一个 GPT 活力单位。

$$\text{GPT (U/mL)} = x \times (V_{\text{样本}} + R_{41799} - A) \div V_{\text{样本}} \div T = 12x$$

(4) 按细胞或细菌数量计算:

单位定义: 每小时每 10⁴ 个细胞或细菌催化产生 1 μ mol 丙酮酸的量为一个 GPT 活力单位。

$$\text{GPT (U/10}^4 \text{ cell)} = x \times (V_{\text{样本}} + R_{41799} - A) \div (500 \times V_{\text{样本}} \div V_{\text{样总}}) \div T = 0.024x$$

V 样本: 0.005mL; R₄₁₇₉₉-A: 0.025mL; V 样总: 提取液体积, 1mL; W: 样本质量, g; C_{pr}: 样本蛋白质浓度, mg/mL; T: 反应时间, 0.5h; 500: 细胞或细菌总数, 500 万。