



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyyssw@sina.com

产品名称: **ELN484228**
CAS 号: **312-63-0**
产品货号: **S87632**

生物活性:

Description

ELN484228 是 α -突触核蛋白 (α -synuclein) 的阻断剂, α -突触核蛋白是帕金森病中的关键蛋白质。

Solvent&Solubility

细胞实验:

DMSO 中的溶解度: ≥ 50 mg/mL (198.98 mM); 吸湿的 DMSO 对产品的溶解度有显著影响, 请使用新开封的 DMSO)

* "≥" means soluble, but saturation unknown)

	Solvent Concentration	Mass Concentration	1 mg	5 mg	10 mg
Preparing	1 mM		3.9796 mL	19.8981 mL	39.7962 mL
Stock Solutions	5 mM		0.7959 mL	3.9796 mL	7.9592 mL
	10 mM		0.3980 mL	1.9898 mL	3.9796 mL

*请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。

储备液的保存方式和期限: -80°C , 2 years; -20°C , 1 year. -80°C 储存时, 请在 2 年内使用, -20°C 储存时, 请在 1 年内使用。

动物实验:

请根据您的 实验动物和给药方式 选择适当的溶解方案。

以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液, 再依次添加助溶剂:

——为保证实验结果的可靠性, 澄清的储备液可以根据储存条件, 适当保存; 体内实验的工作液, 建议您现用现配, 当天使用;

以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比; 如在配制过程中出现沉淀、析出现象, 可以通过加热和/或超声的方式助溶

方案 一

请依序添加每种溶剂: 10% DMSO $\rightarrow$ 40% PEG300 $\rightarrow$ 5% Tween-80 $\rightarrow$ 45% Saline

Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (9.95 mM); 澄清溶液

此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液。

以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中, 混合均匀; 再向上述体系中加入 50 μL Tween-80, 混合均匀; 然后再继续加入 450 μL 生理盐水 定容至 1 mL。

生理盐水的配制: 将 0.9 g 氯化钠, 溶解于 ddH₂O 并定容至 100 mL, 可以得到澄清透明的生理盐水溶液。

方案 二

请依序添加每种溶剂: 10% DMSO $\rightarrow$ 90% (20% SBE- β -CD in Saline)

Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (9.95 mM); 澄清溶液

此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液。

以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 20% 的 SBE- β -CD 生理盐水水溶液 中, 混合均匀。

2 g SBE- β -CD (磺丁基醚 β -环糊精) 粉末定容于 10 mL 的生理盐水中, 完全溶解至澄清透明。

方案 三



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyyssw@sina.com

	请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 90% Corn Oil Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (9.95 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液, 此方案实验周期在半个月以上的动物实验酌情使用。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 玉米油中, 混合均匀。
参考文献	[1]. Tóth G, et al. Targeting the intrinsically disordered structural ensemble of α-synuclein by small molecules as a potential therapeutic strategy for Parkinson's disease. PLoS One. 2014 Feb 14;9(2):e87133.

完整储备液配制表:

请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。

储备液的保存方式和期限: -80°C , 2 years; -20°C , 1 year. -80°C 储存时, 请在 2 年内使用, -20°C 储存时, 请在 1 年内使用。

可选溶剂	质量 溶剂体积 浓度	1 mg	5 mg	10 mg	25 mg
DMSO	1 mM	3.9796 mL	19.8981 mL	39.7962 mL	99.4906 mL
	5 mM	0.7959 mL	3.9796 mL	7.9592 mL	19.8981 mL
	10 mM	0.3980 mL	1.9898 mL	3.9796 mL	9.9491 mL
	15 mM	0.2653 mL	1.3265 mL	2.6531 mL	6.6327 mL
	20 mM	0.1990 mL	0.9949 mL	1.9898 mL	4.9745 mL
	25 mM	0.1592 mL	0.7959 mL	1.5918 mL	3.9796 mL
	30 mM	0.1327 mL	0.6633 mL	1.3265 mL	3.3164 mL
	40 mM	0.0995 mL	0.4975 mL	0.9949 mL	2.4873 mL
	50 mM	0.0796 mL	0.3980 mL	0.7959 mL	1.9898 mL
	60 mM	0.0663 mL	0.3316 mL	0.6633 mL	1.6582 mL
	80 mM	0.0497 mL	0.2487 mL	0.4975 mL	1.2436 mL
	100 mM	0.0398 mL	0.1990 mL	0.3980 mL	0.9949 mL