



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyyssw@sina.com

产品名称: **AM 92016 hydrochloride**

CAS 号: **133229-11-5**

产品货号: **S87729**

生物活性:

Description

AM-92016 hydrochloride 是整流钾电流 (IK) 的特异性阻断剂。AM-92016 hydrochloride 延迟整流钾通道, 使膜复极化, 从而限制神经冲动的持续时间。

Solvent&Solubility

细胞实验:

DMSO 中的溶解度 : 125 mg/mL (258.35 mM); 超声助溶; 吸湿的 DMSO 对产品的溶解度有显著影响, 请使用新开封的 DMSO)

	Solvent / Mass / Concentration	1 mg	5 mg	10 mg
	Concentration			
Preparing	1 mM	2.0668 mL	10.3340 mL	20.6680 mL
Stock Solutions	5 mM	0.4134 mL	2.0668 mL	4.1336 mL
	10 mM	0.2067 mL	1.0334 mL	2.0668 mL

*请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。

储备液的保存方式和期限: -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)。-80°C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20°C 储存时, 请在 1 个月内使用。

动物实验:

请根据您的实验动物和给药方式 选择适当的溶解方案。

以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液, 再依次添加助溶剂:

——为保证实验结果的可靠性, 澄清的储备液可以根据储存条件, 适当保存; 体内实验的工作液, 建议您现用现配, 当天使用;

以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比; 如在配制过程中出现沉淀、析出现象, 可以通过加热和/或超声的方式助溶

方案 一

请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 40% PEG300 → 5% Tween-80 → 45% Saline

Solubility: ≥ 2.17 mg/mL (4.48 mM); 澄清溶液

此方案可获得 ≥ 2.17 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液。

以 1 mL 工作液为例, 取 100 μ L 21.7 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μ L PEG300 中, 混合均匀; 再向上述体系中加入 50 μ L Tween-80, 混合均匀; 然后再继续加入 450 μ L 生理盐水 定容至 1 mL。

生理盐水的配制: 将 0.9 g 氯化钠, 溶解于 ddH₂O 并定容至 100 mL, 可以得到澄清透明的生理盐水溶液。

方案 二

请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 90% (20% SBE- β -CD in Saline)

Solubility: ≥ 2.17 mg/mL (4.48 mM); 澄清溶液

此方案可获得 ≥ 2.17 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液。

以 1 mL 工作液为例, 取 100 μ L 21.7 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μ L 20% 的 SBE- β -CD 生理盐水水溶液 中, 混合均匀。

2 g SBE- β -CD (磺丁基醚 β -环糊精) 粉末定容于 10 mL 的生理盐水中, 完全溶解至澄清透明。

方案 三

请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 90% Corn Oil

Solubility: ≥ 2.17 mg/mL (4.48 mM); 澄清溶液



	此方案可获得 $\geq 2.17 \text{ mg/mL}$ (饱和度未知) 的澄清溶液, 此方案实验周期在半个月以上的动物实验酌情使用。 以 1 mL 工作液为例, 取 $100 \mu\text{L}$ 21.7 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 $900 \mu\text{L}$ 玉米油中, 混合均匀。
参考文献	[1]. Connors SP, et al. Actions and mechanisms of action of novel analogues of sotalol on guinea-pig and rabbit ventricular cells. Br J Pharmacol. 1992 Aug;106(4):958-65.

完整储备液配制表:

请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。

储备液的保存方式和期限: -80°C , 6 months; -20°C , 1 month (sealed storage, away from moisture and light)。 -80°C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20°C 储存时, 请在 1 个月内使用。

可选溶剂	质量 溶剂体积 浓度	1 mg	5 mg	10 mg	25 mg
DMSO	1 mM	2.0668 mL	10.3340 mL	20.6680 mL	51.6700 mL
	5 mM	0.4134 mL	2.0668 mL	4.1336 mL	10.3340 mL
	10 mM	0.2067 mL	1.0334 mL	2.0668 mL	5.1670 mL
	15 mM	0.1378 mL	0.6889 mL	1.3779 mL	3.4447 mL
	20 mM	0.1033 mL	0.5167 mL	1.0334 mL	2.5835 mL
	25 mM	0.0827 mL	0.4134 mL	0.8267 mL	2.0668 mL
	30 mM	0.0689 mL	0.3445 mL	0.6889 mL	1.7223 mL
	40 mM	0.0517 mL	0.2583 mL	0.5167 mL	1.2917 mL
	50 mM	0.0413 mL	0.2067 mL	0.4134 mL	1.0334 mL
	60 mM	0.0344 mL	0.1722 mL	0.3445 mL	0.8612 mL
	80 mM	0.0258 mL	0.1292 mL	0.2583 mL	0.6459 mL
	100 mM	0.0207 mL	0.1033 mL	0.2067 mL	0.5167 mL