



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyyssw@sina.com

产品名称: Toloxatone (MD 69276)

CAS 号: 29218-27-7

产品货号: S87747

生物活性:

Description	Toloxatone (MD 69276) 是一种可逆的单胺氧化酶 A (MAOA) 抑制剂。用作抗抑郁剂。				
IC50 & Target	MAOA[1].				
Solvent&Solubility	细胞实验:				
	DMSO 中的溶解度 : 125 mg/mL (603.19 mM; 超声助溶; 吸湿的 DMSO 对产品的溶解度有显著影响, 请使用新开封的 DMSO)				
	SolventMassConcentration	1 mg	5 mg	10 mg	
	Preparing	1 mM	4.8256 mL	24.1278 mL	48.2556 mL
	Stock Solutions	5 mM	0.9651 mL	4.8256 mL	9.6511 mL
	10 mM	0.4826 mL	2.4128 mL	4.8256 mL	
*请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限: -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light)。-80°C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20°C 储存时, 请在 1 个月内使用。 动物实验: 请根据您的实验动物和给药方式 选择适当的溶解方案。 以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液, 再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性, 澄清的储备液可以根据储存条件, 适当保存; 体内实验的工作液, 建议您现用现配, 当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比; 如在配制过程中出现沉淀、析出现象, 可以通过加热和/或超声的方式助溶 方案 一 请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 40% PEG300 → 5% Tween-80 → 45% Saline Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (10.04 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.08 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 20.8 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中, 混合均匀; 再向上述体系中加入 50 μL Tween-80, 混合均匀; 然后再继续加入 450 μL 生理盐水 定容至 1 mL。 生理盐水的配制: 将 0.9 g 氯化钠, 溶解于 ddH₂O 并定容至 100 mL, 可以得到澄清透明的生理盐水溶液。 方案 二 请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 90% (20% SBE-β-CD in Saline) Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (10.04 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.08 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 20.8 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 20% 的 SBE-β-CD 生理盐水水溶液 中, 混合均匀。 2 g SBE-β-CD (磺丁基醚 β-环糊精) 粉末定容于 10 mL 的生理盐水中, 完全溶解至澄清透明。 方案 三 请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 90% Corn Oil Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (10.04 mM); 澄清溶液					



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyyssw@sina.com

	此方案可获得 ≥ 2.08 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液, 此方案实验周期在半个月以上的动物实验酌情使用。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μ L 20.8 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μ L 玉米油中, 混合均匀。
参考文献	[1]. FMoureau, et al. A reversible monoamine oxidase inhibitor, toloxatone: spectrophotometric and molecular orbital studies of the interaction with flavin adenine dinucleotide (FAD). European Journal of Medicinal Chemistry. 1994, 29(4):269-277.

完整储备液配制表:

请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。

储备液的保存方式和期限: -80° C, 6 months; -20° C, 1 month (protect from light)。 -80° C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20° C 储存时, 请在 1 个月内使用。

可选溶剂	质量 溶剂体积 浓度	1 mg	5 mg	10 mg	25 mg
DMSO	1 mM	4.8256 mL	24.1278 mL	48.2556 mL	120.6389 mL
	5 mM	0.9651 mL	4.8256 mL	9.6511 mL	24.1278 mL
	10 mM	0.4826 mL	2.4128 mL	4.8256 mL	12.0639 mL
	15 mM	0.3217 mL	1.6085 mL	3.2170 mL	8.0426 mL
	20 mM	0.2413 mL	1.2064 mL	2.4128 mL	6.0319 mL
	25 mM	0.1930 mL	0.9651 mL	1.9302 mL	4.8256 mL
	30 mM	0.1609 mL	0.8043 mL	1.6085 mL	4.0213 mL
	40 mM	0.1206 mL	0.6032 mL	1.2064 mL	3.0160 mL
	50 mM	0.0965 mL	0.4826 mL	0.9651 mL	2.4128 mL
	60 mM	0.0804 mL	0.4021 mL	0.8043 mL	2.0106 mL
	80 mM	0.0603 mL	0.3016 mL	0.6032 mL	1.5080 mL
	100 mM	0.0483 mL	0.2413 mL	0.4826 mL	1.2064 mL