



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyyssw@sina.com

产品名称: **Val-Lys(Boc)-PAB**
CAS 号: **1432969-86-2**
产品货号: **S89210**

生物活性:

Description	PAB-Val-Lys-Boc 是一种可降解 (cleavable) 的 ADC linker, 用于合成可用于合成抗体偶联活性分子 (ADC), 用于刺激免疫反应。				
IC50 & Target[1]	Protease Cleavable Linker	Cleavable Linker			
Solvent&Solubility	细胞实验:				
	DMSO 中的溶解度 : 125 mg/mL (277.43 mM; 超声助溶; 吸湿的 DMSO 对产品的溶解度有显著影响, 请使用新开封的 DMSO)				
	Preparing Stock Solutions	Solvent Mass Concentration	1 mg	5 mg	10 mg
		1 mM	2.2194 mL	11.0971 mL	22.1941 mL
		5 mM	0.4439 mL	2.2194 mL	4.4388 mL
	10 mM	0.2219 mL	1.1097 mL	2.2194 mL	
*请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限: -80°C, 6 months; -20°C, 1 month。 -80°C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20°C 储存时, 请在 1 个月内使用。 动物实验: 请根据您的 实验动物和给药方式 选择适当的溶解方案。 以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液, 再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性, 澄清的储备液可以根据储存条件, 适当保存; 体内实验的工作液, 建议您现用现配, 当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比; 如在配制过程中出现沉淀、析出现象, 可以通过加热和/或超声的方式助溶 方案 一 请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 40% PEG300 → 5% Tween-80 → 45% Saline Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (4.62 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.08 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 20.8 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中, 混合均匀; 再向上述体系中加入 50 μL Tween-80, 混合均匀; 然后再继续加入 450 μL 生理盐水 定容至 1 mL。 生理盐水的配制: 将 0.9 g 氯化钠, 溶解于 ddH₂O 并定容至 100 mL, 可以得到澄清透明的生理盐水溶液。 方案 二 请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 90% (20% SBE-β-CD in Saline) Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (4.62 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.08 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 20.8 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 20% 的 SBE-β-CD 生理盐水电溶液 中, 混合均匀。 2 g SBE-β-CD (磺丁基醚 β-环糊精) 粉末定容于 10 mL 的生理盐水中, 完全溶解至澄清透明。 方案 三 请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 90% Corn Oil					



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

	Solubility: ≥ 2.08 mg/mL (4.62 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 2.08 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液, 此方案实验周期在半个月以上的动物实验酌情使用。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 20.8 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 玉米油中, 混合均匀。
参考文献	[1]. Geoffrey Alan Pietersz. Immunomodulatory conjugates.

完整储备液配制表:

请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。

储备液的保存方式和期限: -80°C , 6 months; -20°C , 1 month。 -80°C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20°C 储存时, 请在 1 个月内使用。

可选溶剂	质量 溶剂体积 浓度	1 mg	5 mg	10 mg	25 mg
DMSO	1 mM	2.2194 mL	11.0971 mL	22.1941 mL	55.4853 mL
	5 mM	0.4439 mL	2.2194 mL	4.4388 mL	11.0971 mL
	10 mM	0.2219 mL	1.1097 mL	2.2194 mL	5.5485 mL
	15 mM	0.1480 mL	0.7398 mL	1.4796 mL	3.6990 mL
	20 mM	0.1110 mL	0.5549 mL	1.1097 mL	2.7743 mL
	25 mM	0.0888 mL	0.4439 mL	0.8878 mL	2.2194 mL
	30 mM	0.0740 mL	0.3699 mL	0.7398 mL	1.8495 mL
	40 mM	0.0555 mL	0.2774 mL	0.5549 mL	1.3871 mL
	50 mM	0.0444 mL	0.2219 mL	0.4439 mL	1.1097 mL
	60 mM	0.0370 mL	0.1850 mL	0.3699 mL	0.9248 mL
	80 mM	0.0277 mL	0.1387 mL	0.2774 mL	0.6936 mL
	100 mM	0.0222 mL	0.1110 mL	0.2219 mL	0.5549 mL