



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 400-666-5481 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: 3008007435@qq.com

乙醛脱氢酶(ALDH)活性检测试剂盒(分光光度法)

货号: R41896

规格: 50T/48S

保质期: 6个月

产品组成及保存条件:

编号	规格	储存条件
提取液ES13	50 ml×1瓶	2-8℃保存;
试剂-A	15 ml×1瓶	2-8℃保存;
试剂-B	5ml×1瓶	2-8℃避光保存
试剂-C	3 ml×1瓶	2-8℃避光保存
试剂-D	2 ml×1瓶	2-8℃保存
试剂-E	2 ml×1瓶	2-8℃保存;

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

简介:

意义: 乙醛脱氢酶 (Acetaldehyde Dehydrogenase, ALDH) (EC 1.2.1.10) 是醛脱氢酶的一种, 广泛存在于各种动物、植物和微生物体内。主要作用是将乙醛氧化成乙酸, 在酒精代谢中起主要作用。在人类和许多动物体内, 线粒体乙醛脱氢酶能把对生物体有害的醇类转化, 所以在细胞解毒研究中乙醛脱氢酶受到高度关注; 同时, 乙醛脱氢酶在分子生物学以及相关疾病的检测方面有较广泛的研究应用。

原理: 在辅酶 I 存在的条件下, 乙醛脱氢酶催化乙醛和 NAD⁺ 转化为乙酸和 NADH, 在 340nm 处的吸光值会增加, 测定 340nm 处的吸光值变化, 可计算得到乙醛脱氢酶的活性。

自备用品:

天平、离心机、恒温水浴锅、紫外分光光度计、1mL 石英比色皿、研钵/匀浆器、冰和蒸馏水。

ALDH 提取:



1. 组织: 按照组织质量 (g): 提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织, 加入1mL 提取液 ES13) 进行冰浴匀浆, 然后 10000g, 4℃, 离心 20min, 取上清置于冰上待测。

2. 细胞: 按照细胞数量 (10^4 个): 提取液体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例 (建议 500 万细胞加入 1mL 提取液 ES13), 冰浴超声波破碎细胞 (功率 300w, 超声3秒, 间隔7秒, 总时间3min); 然后 10000g, 4℃, 离心 20min, 取上清置于冰上待测。

3. 液体: 直接检测或适当稀释后再进行检测。

测定步骤:

1. 分光光度计预热 30min, 调节波长至 340nm, 蒸馏水调零。
2. 将试剂-A 37℃ (哺乳动物) 或 25℃ (其他物种) 预热 15min
3. 在 1mL 石英比色皿中依次加入下列试剂:

试剂名称	对照管(ul)	测定管(ul)
上清		200
试剂-A	300	300
试剂-B	100	100
试剂-C	50	50
试剂-D	30	30
试剂-E	20	20
蒸馏水	500	300

充分混匀, 并开始计时, 测定 15s 时 340nm 处测定吸光值 A1 对照和 A1 测定, 然后迅速置于 37℃ 水浴 1min, 于 340nm 处测定吸光值 A2 对照和 A2 测定, $\Delta A_{\text{对照}} = A2_{\text{对照}} - A1_{\text{对照}}$, $\Delta A_{\text{测定}} = A2_{\text{测定}} - A1_{\text{测定}}$, $\Delta A = \Delta A_{\text{测定}} - \Delta A_{\text{空白}}$ 。

注意: 空白管只需做 1-2 次

ALDH 酶活计算:

1. 按蛋白浓度计算



酶活定义: 每毫克蛋白每分钟催化还原 1 nmol NAD⁺ 的酶量为 1 个酶活单位。

$$\text{ALDH 酶活 (U/mg prot)} = \Delta A \div (\epsilon \times d) \times 10^9 \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \times \text{Cpr}) \div T$$
$$= 804 \times \Delta A \div \text{Cpr}$$

2. 按样本质量计算

酶活定义: 每克样品每分钟催化还原 1 nmol NAD⁺ 的酶量为 1 个酶活单位。

$$\text{ALDH 酶活 (U/g)} = \Delta A \div (\epsilon \times d) \times 10^9 \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \times W \div V_{\text{样总}}) \div T$$
$$= 804 \times \Delta A \div W$$

3. 按照细胞数量计算

酶活定义: 每 10⁴个细胞每分钟催化还原 1 nmol NAD⁺ 的酶量为 1 个酶活单位。

$$\text{ALDH 酶活 (U/10}^4\text{cell)} = \Delta A \div (\epsilon \times d) \times 10^9 \times V_{\text{反总}} \div [V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times \text{细胞数量(万个)}] \div T$$
$$= 804 \times \Delta A \div \text{细胞数量(万个)}$$

4. 按液体体积计算

酶活定义: 每毫升蛋白每分钟催化还原 1 nmol NAD⁺ 的酶量为 1 个酶活单位。

$$\text{ALDH 酶活 (U/ml)} = \Delta A \div (\epsilon \times d) \times 10^9 \times V_{\text{反总}} \div V_{\text{样}} \div T$$
$$= 804 \times \Delta A$$

注:

ϵ : NADH 微摩尔消光系数, $6.22 \times 10^3 \text{ L/mol/cm}$;

d : 比色皿光径, 1cm;

$V_{\text{反总}}$: 反应体系总体积, 1mL=0.001L;

$V_{\text{样}}$: 反应体系中样本体积, 0.2mL;

Cpr : 样本蛋白浓度, mg/mL;

W : 样本质量, g;

$V_{\text{样总}}$: 加入提取液体积, 1mL;

T : 反应时间: 1min;

10^9 : 单位换算系数, $1\text{mol}=10^9\text{nmol}$

※ 蛋白定量检测建议使用本公司: BCA Protein Assay Kit



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 400-666-5481 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: 3008007435@qq.com

注意事项:

当样品 ΔA 大于 1 时, 建议将样本用提取液稀释后再进行测定; 当 ΔA 小于 0.01 时, 可以延长反应时间来测定, 并注意计算时同步更改计算公式。



源叶