



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyyssw@sina.com

产品名称: **JAMM protein inhibitor 2**

CAS 号: **848249-35-4**

产品货号: **S89846**

生物活性:

Description	JAMM protein inhibitor 2 (compound 180) is a potent JAMM protease inhibitor with IC50s of 10 μM, 46 μM and 89 μM for thrombin, Rpn11 and MMP2, respectively. JAMM protein inhibitor 2 can be used for researching anticancer[1]				
IC50 & Target	:IC50: 10 μM (thrombin), 46 μM (Rpn11), 89 μM (MMP2)[1]				
Solvent&Solubility	细胞实验: DMSO 中的溶解度 : 14.71 mg/mL (43.46 mM); 超声助溶 (<60°C); 吸湿的 DMSO 对产品的溶解度有显著影响, 请使用新开封的 DMSO)				
	Preparing Stock Solutions	Solvent / Mass / Concentration	1 mg	5 mg	10 mg
		1 mM	2.9547 mL	14.7737 mL	29.5473 mL
		5 mM	0.5909 mL	2.9547 mL	5.9095 mL
		10 mM	0.2955 mL	1.4774 mL	2.9547 mL
* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限: -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light)。-80°C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20°C 储存时, 请在 1 个月内使用。 动物实验: 请根据您的 实验动物和给药方式 选择适当的溶解方案。 以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液, 再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性, 澄清的储备液可以根据储存条件, 适当保存; 体内实验的工作液, 建议您现用现配, 当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比; 如在配制过程中出现沉淀、析出现象, 可以通过加热和/或超声的方式助溶 方案 一 请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 40% PEG300 → 5% Tween-80 → 45% Saline Solubility: 1.47 mg/mL (4.34 mM); 悬浊液; 超声助溶 此方案可获得 1.47 mg/mL 的均匀悬浊液, 悬浊液可用于口服和腹腔注射。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 14.7 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中, 混合均匀; 再向上述体系中加入 50 μL Tween-80, 混合均匀; 然后再继续加入 450 μL 生理盐水 定容至 1 mL。 生理盐水的配制: 将 0.9 g 氯化钠, 溶解于 ddH₂ O 并定容至 100 mL, 可以得到澄清透明的生理盐水溶液。 方案 二 请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 90% (20% SBE-β-CD in Saline) Solubility: 1.47 mg/mL (4.34 mM); 悬浊液; 超声助溶 此方案可获得 1.47 mg/mL 的均匀悬浊液, 悬浊液可用于口服和腹腔注射。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 14.7 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 20% 的 SBE-β-CD 生理盐水水溶液 中, 混合均匀。 2 g SBE-β-CD (磺丁基醚 β-环糊精) 粉末定容于 10 mL 的生理盐水中, 完全溶解至澄清透明。 方案 三					



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyyssw@sina.com

	请依序添加每种溶剂: 10% DMSO → 90% Corn Oil Solubility: ≥ 1.47 mg/mL (4.34 mM); 澄清溶液 此方案可获得 ≥ 1.47 mg/mL (饱和度未知) 的澄清溶液, 此方案实验周期在半个月以上的动物实验酌情使用。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 14.7 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 玉米油中, 混合均匀。
参考文献	[1]. Han-Jie Zhou, et al. Methods and compositions for jamm protease inhibition. WO2013123071A1 (compound 180)

完整储备液配制表:

* 请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。储备液的保存方式和期限: -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light)。-80°C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20°C 储存时, 请在 1 个月内使用。

可选溶剂	质量 溶剂体积 浓度	1 mg	5 mg	10 mg	25 mg
DMSO	1 mM	2.9547 mL	14.7737 mL	29.5473 mL	73.8683 mL
	5 mM	0.5909 mL	2.9547 mL	5.9095 mL	14.7737 mL
	10 mM	0.2955 mL	1.4774 mL	2.9547 mL	7.3868 mL
	15 mM	0.1970 mL	0.9849 mL	1.9698 mL	4.9246 mL
	20 mM	0.1477 mL	0.7387 mL	1.4774 mL	3.6934 mL
	25 mM	0.1182 mL	0.5909 mL	1.1819 mL	2.9547 mL
	30 mM	0.0985 mL	0.4925 mL	0.9849 mL	2.4623 mL
	40 mM	0.0739 mL	0.3693 mL	0.7387 mL	1.8467 mL