



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

产品名称: 盐酸三甲氧苯酰胺

产品别名: Trimethobenzamide hydrochloride; Ro 2-9578; 盐酸曲美苳胺

生物活性:				
Description	Trimethobenzamide hydrochloride is a blocker of the D ₂ receptor. Trimethobenzamide is an antiemetic used to prevent nausea and vomiting.			
IC ₅₀ & Target	D ₂ receptor[1]			
In Vitro	Trimethobenzamide is a (non-phenothiazine) benzamide antiemetic that acts centrally to block D ₂ receptors, thereby inhibiting the medullary chemoreceptor trigger zone by blocking emetic impulses to the vomiting center[1].			
In Vivo	The oral bioavailability of Trimethobenzamide is 60% to 100%. The time to peak is about 45 minutes after oral administration and; Intramuscular (I.M.) administration about 30 minutes after intramuscular administration[1].			
Solvent&Solubility	In Vitro: DMSO : ≥ 100 mg/mL (235.34 mM) * "≥" means soluble, but saturation unknown.			
	Preparing Stock Solutions	Solvent	Mass	
		Concentration		
			1 mg	5 mg
				10 mg
		1 mM	2.3534 mL	11.7669 mL
		5 mM	0.4707 mL	2.3534 mL
		10 mM	0.2353 mL	1.1767 mL
				2.3534 mL
	*请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限: -80°C, 6 months; -20°C, 1 month。 -80°C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20°C 储存时, 请在 1 个月内使用。			
	In Vivo: 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液, 再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性, 澄清的储备液可以根据储存条件, 适当保存; 体内实验的工作液, 建议您现用现配, 当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比; 如在配制过程中出现沉淀、析出现象, 可以通过加热和/或超声的方式助溶 1.请依序添加每种溶剂: 10% DMSO→40% PEG300 →5% Tween-80 → 45% saline Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (5.88 mM); Clear solution 此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL (5.88 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μL PEG300 中, 混合均匀向上述体系中加入 50 μL Tween-80, 混合均匀; 然后继续加入 450 μL 生理盐水定容至 1 mL。 2.请依序添加每种溶剂: 10% DMSO→ 90% (20% SBE-β-CD in saline) Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (5.88 mM); Clear solution 此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL (5.88 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 20% 的 SBE-β-CD 生理			



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

	盐水水溶液中，混合均匀。 3.请依序添加每种溶剂： 10% DMSO →90% corn oil Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (5.88 mM); Clear solution 此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL (5.88 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液，此方案不适用于实验周期在半个月以上的实验。 以 1 mL 工作液为例，取 100 μL 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 900 μL 玉米油中，混合均匀。
References	[1]. Smith HS, et al. Dopamine receptor antagonists. Ann Palliat Med. 2012 Jul;1(2):137-42.



源叶生物