



上海源叶生物科技有限公司
Shanghai yuanye Bio-Technology Co., Ltd
电话: 021-61312973 传真: 021-55068248
网址: www.shyuanye.com
邮箱: shyysw@sina.com

产品名称: **4-Amino-N-phenethylbenzenesulfonamide**
产品别名: **C-7280948**

生物活性:				
Description	C-7280948 is a PRMT1 inhibitor. IC50 value: Target: PRMT1 in vitro: Especially arginine methyltransferases also target non-histone protein substrates and are therefore often called protein methyltransferases (PRMTs). The subtype PRMT1 has been linked to the activation of estrogen and androgen receptors and therefore may represent a new treatment option for hormone-dependent cancer. C-7280948 is a inhibitor, which is available for PRMT1.			
	In Vitro: DMSO : ≥ 38 mg/mL (137.51 mM) * "$\geq$" means soluble, but saturation unknown.			
Solvent&Solubility	Preparing	Solvent / Mass / Concentration	1 mg	5 mg
		1 mM	3.6186 mL	18.0930 mL
	Stock Solutions	5 mM	0.7237 mL	3.6186 mL
		10 mM	0.3619 mL	1.8093 mL
	*请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液; 一旦配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。 储备液的保存方式和期限: -80°C, 6 months; -20°C, 1 month。 -80°C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20°C 储存时, 请在 1 个月内使用。 In Vivo: 请根据您的实验动物和给药方式选择适当的溶解方案。以下溶解方案都请先按照 In Vitro 方式配制澄清的储备液, 再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性, 澄清的储备液可以根据储存条件, 适当保存; 体内实验的工作液, 建议您现用现配, 当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在您配制终溶液中的体积占比; 如在配制过程中出现沉淀、析出现象, 可以通过加热和/或超声的方式助溶 1.请依序添加每种溶剂: 10% DMSO→40% PEG300 →5% Tween-80 → 45% saline Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (9.05 mM); Clear solution 此方案可获得 ≥ 2.5 mg/mL (9.05 mM, 饱和度未知) 的澄清溶液。 以 1 mL 工作液为例, 取 100 μ L 25.0 mg/mL 的澄清 DMSO 储备液加到 400 μ L PEG300 中, 混合均匀; 向上述体系中加入 50 μ L Tween-80, 混合均匀; 然后继续加入 450 μ L 生理盐水定容至 1 mL。			
References	[1]. Bissinger EM, et al. Acyl derivatives of p-aminosulfonamides and dapsone as new inhibitors of the arginine methyltransferase hPRMT1. Bioorg Med Chem. 2011 Jun 15;19(12):3717-3731.			